

使用に際しては、この説明書を読んでください。
また、ご使用中は保管してください。

貯 法：室温保存、火気注意

* 使用期限：化粧箱等に記載

指定医薬部外品 外皮消毒剤

販売名「サニコットβa2」

製品名「Nサニコットパウチ60P」「Nサニコットパウチ200P」



ご使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジングルコン酸塩によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態です長時間皮膚と接触させないこと。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 粘膜へは使用しないこと。

【成分】

成分	1包中
日局クロルヘキシジングルコン酸塩液	0.007mL
日局エタノール	1.02mL
医療脱脂綿	0.32g (4cm×4cm、1枚入)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので安心してお使いください。

【包装】

* 個包装タイプ

1. N サニコットパウチ 60包入(4cm×4cm)
2. N サニコットパウチ 200包入(4cm×4cm)

【消費者相談窓口】

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地

お客様相談室 TEL : 0893-25-1486

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

<https://www.marusan-sangyo.co.jp/>

商品の異常等でお困りの際は、お手元にお取り置きの上ご連絡ください。

<製造販売元>

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地